

**Komunikat**  
**Głównego Inspektora Sanitarnego**  
**w sprawie sytuacji epidemiologicznej odrzy w Polsce**

z dnia 24.05.2012 r.

Sytuację epidemiologiczną odrzy w Polsce należy uznać za stabilną.

Polska nie jest krajem endemicznego występowania tej choroby, nie obserwuje się również epidemicznego jej występowania, a jedynie cykliczny, występujący co 2 lata, nieznaczny wzrost liczby zachorowań.

W 2012 roku do 15 maja stwierdzono 20 przypadków zachorowań, w 2011 roku - 39 przypadków, w 2010 roku - 13, natomiast w 2009 - 114 przypadków.

Liczba przypadków zachorowań na odrę w Polsce jest kilkakrotnie razy niższa w odniesieniu do wielu krajów Unii Europejskiej, m.in. Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, czy Włoch.

Stosunkowo niewysoka liczba zachorowań na odrę w Polsce wynika z wysokiego stopnia zaszczepienia (95%), wynikającego z prowadzonych systematycznie od 1975 roku masowych obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci.

Szczepienie podstawowe wykonuje się skojarzoną szczepionką potrójną przeciw odrze, śwince i różyczce w 13-14 miesiącu życia. Dawkę przypominającą szczepionki skojarzonej przeciw odrze, śwince i różyczce podaje się w 10 roku życia.

Z uwagi na niestabilną sytuację epidemiologiczną odrzy w Europie oraz potencjalną możliwość wzrostu liczby przypadków zachorowań w Polsce, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą stały monitoring i nadzór nad występowaniem tej choroby.

Główny Inspektor Sanitarny  
Z up.   
Marek Posobkiewicz  
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego